

Bagaimana Epilepsi bisa Terjadi?

Adanya gangguan listrik pada sel-sel saraf pada satu bagian tersebut terjadi hantaran listrik yang tidak terkontrol, terjadi berulang atau abnormal

PERTOLONGAN PERTAMA EPILEPSI

- ✓ Hindarkan benturan kepala atau bagian tubuh lainnya dari benda keras, tajam atau panas, jauhkan dari tempat atau benda berbahaya
- ✓ Longgarkan bajunya, miringkan kepalanya kesamping untuk mencegah lidahnya sampai menutupi jalan nafas
- ✓ Biarkan kejang berlangsung, jangan memasukkan benda keras diantara giginya, karena dapat menyebabkan patah gigi
- ✓ Penderita akan mengantuk dan bingung setelah kejang, biarkan istirahat
- ✓ Laporkan pada keluarga terdekatnya, hal ini penting untuk penglihatan oleh dokter
- ✓ Bila serangan berulang-ulang dalam waktu singkat atau penderita terluka berat, bawa segera ke dokter atau rumah sakit terdekat

MENGENAL EPILEPSI



IGD 24 Jam 
0852-1968-3631

Contact Us

-  Jl. Raya Tayu - Pati KM. 03 No. 99A,
Pakis, Tayu, Pati, Jawa Tengah 59155
-  (0295) 415045
-  0822-2665-6907
-  sebeningkasih@yahoo.co.id
-  www.rsusebeningkasih.com

APA ITU EPILEPSI

Epilepsi adalah gangguan pada sistem saraf pusat akibat adanya pola aktivitas listrik di otak yang berlebihan. Gejala utama dari epilepsi yaitu kejang tanpa penyebab yang jelas pada sebagian atau seluruh tubuh.

APA PENYEBAB EPILEPSI?



Gangguan perkembangan seperti autisme dan neurofibromatosis.



Cedera sebelum persalinan. Hal ini karena sebelum lahir, bayi sensitif terhadap kerusakan otak yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kekurangan oksigen, nutrisi buruk, atau infeksi pada ibu.



Penyakit menular seperti HIV/AIDS, meningitis, serta ensefalitis virus.



Kondisi otak yang menyebabkan kerusakan pada otak, seperti stroke dan tumor otak




Cedera pada kepala akibat kecelakaan, terjatuh, atau cedera traumatik lainnya.



Pengaruh genetik apabila Anda memiliki riwayat keluarga dengan epilepsi.

KAPAN HARUS KE DOKTER?



Kejang berlangsung lebih dari 5 menit.



Kelelahan akibat panas



Kejang kedua berlangsung segera setelahnya.




Pernapasan atau kesadaran tidak kembali setelah kejang berhenti.



Demam tinggi



Sedang hamil



Memiliki diabetes



Gejala Epilepsi

- ✓ Tatapan kosong (terlalu lama fokus pada satu titik)
- ✓ Gejala psikis
- ✓ Otot terasa kaku
- ✓ Merasa kebingungan sementara
- ✓ Gerakan menyentak pada kaki dan tangan yang tak terkendali
- ✓ Kejang/tremor pada sebagian tubuh atau keseluruhan
- ✓ Mengalami kejang yang disertai dengan tubuh menegang dan hilang kesadaran secara spontan sehingga penderitanya tiba-tiba terjatuh

Faktor Risiko Epilepsi

Riwayat kejang di masa kecil

Riwayat keluarga dengan epilepsi

Demensia

Infeksi otak

Cedera pada kepala

Penyakit vaskular atau stroke

Berusia di bawah 2 tahun atau lansia di atas 65 tahun